

Produkt	Wirkstoff ¹⁾	Gehalt g je l bzw. kg	Zulassung										Abstand		Krankheiten																				
			FRAC	Einsatz EC	Gerste	Weizen	Roggen	Triticale	Dinkel	S-Weizen	S-Gerste	Hafer	Menge (l bzw. kg je ha)	Preis (€ je ha) ²⁾	Gebinde (l/kg)	Einsatzhäufigkeit	Hang >2 % (m) ³⁾	Wasser (m) ⁴⁾	Saum (m)	Halmbruch	Stoppwirkung	Dauerwirkung	Netzflecken	Rynchosporium	Ramularia	Braunrost	Gelbrost	heilend	vorbeugend	Septoria nodorum	DTR	Ährenfusariosen			
Anilino-pyrimidine/Triazole																																			
Unix (im Pack)	Cyprodinil	750	9	30-55	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,0	5	2	20	5/*	0		●●●●	●	●●●●	●●●	●●●		●	●		●	●●●●	●●●●					
Kayak	Cyprodinil	300	9	31-61	✓							1,5	23	5	2	20	5/*	0		●●●●	●	●●	●●	●		●	●								
Greteg	Difenoconazol	250	3	31-69		✓	✓	✓	✓	✓		0,5			1	0	5/*	0							●●●	●●	●●●	●●●	●●●●	●●●●					
Magnello	+ Tebuconazol	100 +250	3 3	51-69		✓				✓	✓	1,0	37	5; 15	1	0	5/*	0			●	●●●			●●●●●	●●●●●	●●●	●●	●●●●●	●●●●	●●●●				
Amistar Gold	+ Azoxystrobin	125 +125	3 11	31-69		✓				✓	✓	1,0	35		1	0	5/*	0							●●●●	●●●	●●●	●●●	●●●●	●●●●					
Revystar (i. Pack)	Mefentrifluconazol	100	3	30-69	✓	✓		✓	✓	✓	✓	1,5	47	10	2	0	5/*	0				●	●	●●●●	●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●				
Balaya	+ Pyraclostrobin	100 100	3 11	30-61	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,5	60	10	2	0	5/*	0		●●●		●	●●●●●	●	●●●●	●●●	●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●				
Plexeo/Caramba	Metconazol	60	3	25-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,5	30	5	2	0	5/*	0			●	●	●●	●●		●●●●	●●●	●	●●	●●●●	●	●●●			
Triazole/Phthalimide																																			
Proline/Curbatur	Prothioconazol ⁶⁾	250	3	29-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0,8	36	3; 5;	3	10	5/*	0				●●●		●	●●●	●●●●	●●	●●	●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	
Aurelia		250	3	29-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0,8	32	15	3	10	5/*	0					●●●		●	●●●	●●●●	●●	●●	●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Protendo 250 EC		250	3	30-71	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0,8		5	bis 3	20	5/*	0					●●●		●	●●●	●●●●	●●	●●	●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Tokyo, Helsinki, Abran		250	3	29-69	✓	✓	✓	✓		✓	✓	0,8	38	5	bis 3	20	5/*	0					●●●		●	●●●	●●●●	●●	●●	●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Traciafin		250	3	25-71	✓	✓	✓	✓		✓	✓	0,8	38	5	bis 3	20	5/*	0					●●●		●	●●●	●●●●	●●	●●	●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Pecari, Patel, Protendo forte		300	3	30-69	✓	✓	✓	✓		✓	✓	0,65		5	2	0	5/*	0					●●●		●	●●●	●●●●	●●	●●	●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Promino 300 EC		300	3	30-69		✓	✓			✓		0,65		5	2	10	5/*	0					●●●		●	●●●	●●●●	●●	●●	●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Input Classic		+ Spiroxamine	160 +300	3	30-69	✓	✓	✓	✓		✓	✓	1,25	54	5; 15	2	20	15	0				●●●	●●●	●●●	●●●	●●●●	●●	●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Hint		+ Spiroxamine	160 +300	3	30-71	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,25		5; 15	2	20	15	0				●●●	●●●	●●●	●●●	●●●●	●●	●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Delaro Forte		+ Spiroxamine + Trifloxistrobin	93,3 +107 +80	3 5 11	25-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,5											●●●●	●	●●●	●●●●	●●●●	●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●	●●●	
Prosaro	+ Tebuconazol	125 +125	3	25-61	✓	✓	✓	✓			1,0	46	5; 15	2	10	5/*	0					●●	●	●●●	●●	●●●	●●●●	●●●	●●	●●●●	●●	●●●●	●●	●●●●	
Folicur/Balet	Tebuconazol	250	3	25-69	✓	✓	✓		✓	✓		bis 1,25	26	1; 5; 15	2	10	5/*	0							●●●●	●●●●	●	●	●●●	●	●●●	●	●●●		
Orius		200	3	32-61	✓	✓	✓	✓	✓	✓		bis 1,5	20	5; 10	2	10	5/*	0								●●●●	●●●●	●	●	●●●	●	●●●	●	●●●	
Helocur 250 EW		250	3	30-69	✓	✓	✓		✓	✓	✓	bis 1,25	20	5	2	10	5/*	0								●●●●	●●●●	●	●	●●●	●	●●●	●	●●●	
Tebucur 250 EW		250	3	30-69	✓	✓	✓		✓	✓	✓	bis 1,25	22	5	2	10	5/*	0									●●●●	●●●●	●	●	●●●	●	●●●	●	●●●
Tebu 25		250	3	29-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	bis 1,25		5	1	10	5/*	0									●●●●	●●●●	●	●	●●●	●	●●●	●	●●●
Teson		250	3	30-69	✓	✓	✓		✓	✓	✓	bis 1,25		5	2	10	5/*	0									●●●●	●●●●	●	●	●●●	●	●●●	●	●●●
Fezan		250	3	30-71	✓	✓			✓	✓	✓	1,0		5; 10	2	5	5/*	0									●●●●	●●●●	●	●	●●●	●	●●●	●	●●●
Pronto Plus		+ Spiroxamine	133 +250	3 5	25-69	✓	✓	✓		✓	✓	1,5	34	5; 15	2	20	15	0					●●●	●●●	●●●	●●		●●●●	●●●●	●	●	●●●	●●	●●●	
Soleil/Sakura	+ Bromuconazol	107 167	3 3	30-69		✓			✓	✓	1,2	28	10	1	0	5/*	0								●●	●●		●	●●●	●	●●●	●	●●●●		
Folpan 500 SC	Folpet	500	M04	30-59	✓	✓			✓	✓	1,5		5	2	20	15	5/*	0						●●●	●	●		●●●	●●●						
Amistar Max ⁷⁾	+ Azoxystrobin	500 +93,5	M04 11								1,5																●●●	●●●●	●						

1) fett = Hauptwirkstoff; 2) Quelle: myagrar.de, Stand Nov. 2023 ohne MwSt.; 3) bei Pflugsaat dicht bewachsener Randstreifen erforderlich, angegeben ist die Mindestbreite; 4) bei Einsatz von 90 %-abdriftmindernden Düsen; 5) gilt auch für Azoxystar; 6) es gibt noch weitere Mittel die Prothioconazol als Solowirkstoff enthalten (Mengen, Indikationen u. Auflagen beachten); 7) Zulassung wird erwartet; * = länderspezifischer Mindestabstand zum Gewässer

Wirkbeurteilung: ●●●●● überragende Wirkung, ●●●● sehr gute Wirkung, ●●● gute Wirkung, ●● noch gute Wirkung, ● Teilwirkung; Gelbrostwirkung ist oft besser als dargestellt top agrar; Quelle: Bewertung nach Erfahrungen der LWK Nordrhein-Westfalen